

**SCORZONERA ALBICANS COSSON, FORMA
LONGIFOLIA NEGRILLO NOVA**

A. M^a NEGRILLO GALINDO *
G. MARÍN CALDERÓN *

Key words: Taxonomy, *Scorzonera*

RESUMEN.— Se describe una forma nueva de *Scorzonera albicans* (forma *longifolia*) para la provincia de Granada.

SUMMARY.— A new form of *Scorzonera albicans* (form *longifolia*) is described for the province of Granada).

INTRODUCCIÓN

Revisado el material del Real Jardín Botánico: «*Scorzonera albicans* var. *albicans*, S^a de Segura, VI-1902., *Reverchon* (MA 138972), idem, VI-1906 (MA 138972). Sierra de Castril, Granada, VI-1903, *Reverchon* (MA 138973). Albacete, Calar del Mundo, S^a de Alcaraz, 2-VI-1891, Porta y Rigo (MA 138974) y de la Facultad de Farmacia, *Scorzonera albicans* var. *albicans*. Granada, S^a de la Sagra, 22-VII-1978, *Negrillo* (GDA 11894). *Idem*, VII-1983, *Negrillo*, *Marín* y *Hurtado* (GDA 15436), llegamos a la conclusión de que el taxon que nos ocupa debe ser considerado como una nueva forma.

***Scorzonera albicans* Cosson forma *longifolia* Negrillo *nova*.**

Folia lanceolato linearia, integra, plana 30 × 0,8 cm colore viride pubescente, quasi velutino sed minima tomentosum; differt typo ut exhibet colorem album tomentosum sive viridem griseum sive niveum tomentosum. Caulos florales ascendentes, ramoso 6-12 cm longos. Pilos. Pilos aquenii 3,5 mm longos.

TYPUS: Sierra de la Sagra. Cortijos de la Umbria 30SWG3699 ad 1750 m, in solo calcareo 22-VII-1978. *Negrillo*, *lecta* (GDA 11894).

Se diferencia del tipo descrito por COSSON in *Not. Pl. Crit.* 119 (1851);

a) por presentar hojas linear-lanceoladas de 30 × 0,8 cm en lugar de 3-10 ×

* Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Granada.

0.1-0.5 (0.8) cm de color verde, pubescentes algo vellosas pero nunca formando tomento, a diferencia del tipo en que varían de blanco tomentosas-verde grisáceas a ní-



FIG.— *Scorzonera albicans* Cosson forma *longifolia* Negrillo nova
A: Aspecto general. B: Fruto. Escala: 3/4 del natural.

veo-tomentosas. b) Escapo floral no sencillo, ramificado y de longitud superior a la dada por el tipo de 6-12 cm. c) Los pelos del aquenio de mayor tamaño (3.5 mm).

DISTRIBUCIÓN: Sólo hemos herborizado en la Sagra (Granada) dicho taxon en el ascenso por Cortijos de la Umbría.

ECOLOGÍA: Al igual que el tipo habita en pedregales calizos, ligeramente nitrificados por el ganado.

(Aceptado para su publicación el 9-X-1985)