

NOTAS COROLÓGICAS LEVANTINAS, VI

M. COSTA *
J.B. PERIS *
G. STÜBING *

Key words: Chorology, vascular plants, Levante, Spain.

RESUMEN.— Se relacionan algunos taxones cuya presencia en el territorio valenciano puede ser interesante desde el punto de vista corológico, ecológico y fitosociológico.

SUMMARY.— Some taxa whose location in the valencian area may be interesting under an chorological, ecological and phytosociological point of view, are cited.

INTRODUCCIÓN

La cesión del Herbario de MANUEL CALDUCH al Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia de Valencia y la inclusión del mismo en el Herbario del Departamento (VF), revela el interés de algunos de los pliegos herborizados por él. Consideramos que es un material que ha permanecido oculto durante años y que vale la pena sacar a la luz, al tiempo que queremos sirva de homenaje a la labor callada y entusiasta de ese gran botánico que fue Calduch.

De los más de 7.000 pliegos que constituyen el Herbario Calduch, entresacamos por su interés 5 citas que se irán ampliando en notas sucesivas.

Allium triquetrum L.

VALENCIA: Valencia —Camino de Vera— (L'Horta Nord). Formando parte del estrato herbáceo de olmedas hipernitrificadas del *Acantho mollis-Ulmetum minoris* Costa & al. inéd. Sólo conocemos una cita de J. BORJA (*Anales Jard. Bot. Madrid*, 9: 436, 1949) para Alzira (Valencia). VF-12373.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

VALENCIA: Valencia —Camino de Vera— (L'Horta Nord). Planta de uso común en jardinería, se subespontaneiza frecuentemente en las olmedas hipernitri-

* Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Valencia.

ficadas (*Acantho mollis-Ulmetum minoris* Costa & al. inéd.) de la plana cuaternaria valenciana, donde localmente se hace dominante por su acusado carácter colonizador. VF-12376.

Centaureum tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. ***acutiflorum*** (Schott) Zeltner

CASTELLÓN: Cabanes (La Plana Alta). En pastizales halonitrófilos terofíticos de *Frankenietea pulverulentae* Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 desarrollados sobre suelos arenosos periódicamente encharcados. No tenemos referencia de otras citas para la Comunidad Valenciana. VF-12371.

Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss.

CASTELLÓN: Benicassim (La Plana Alta). Un pliego de *Calduch* (VF-4114). Este elemento muy frecuente en las comunidades manchegas de *Diploaxion erucoidis* Br.-Bl. (1931) 1936 es raro en el sector Setabense, y muy raro en el Valenciano-Tarraconense. No está citada, según nuestras referencias para la provincia de Castellón.

Cystisus sessilifolius L.

CASTELLÓN: Mangreber (Tinança de Benifassá). Forma parte de la orla de los carrascales mesomediterráneos mesófilos del *Quercenion rotundifoliae* (Rivas Goday 1959) Rivas-Martínez 1975. No tenemos referencia de otras citas para la Comunidad Valenciana. VF-12372.

Globularia x montiberica G. López

VALENCIA: La Hunde (Valles de Ayora). En repisas y fisuras de lajas calizas de ligera o mediana inclinación, formando parte del *Thymo piperellae-Hypericetum erucoidis* Costa, Peris & Stübing in Costa & Peris 1984. No tenemos referencia de otras citas para la Comunidad Valenciana. VF-12101.

Lotus ornithopodioides L.

CASTELLÓN: Borriana (La Plana Baixa). Terófito frecuente en comunidades arvenses de *Stellarietea mediae* R. Tx., Lohmeyer & Preising in R. Tx. 1950 ampl. Rivas-Martínez 1977 propias de los naranjales castellonenses. para la provincia de Castellón solo conocemos la referencia de O. BOLÓS & J. VIGO (*Flora dels Països Catalans*: 614, 1984) para L'Alt Palancia. VF-12377.

Mesembryanthemum nodiflorum L.

CASTELLÓN: Illes Columbrets. Un pliego de *Calduch* (VF-4056) de este terófito crasicaule halonitrófilo frecuente en zonas de ombroclima semiárido y con óptimo peninsular en la provincia Murciano-Almeriense. Se presenta muy frecuente en estas islas y representa una interesante disyunción que confirma no sólo el carácter semiárido de las mismas, sino también sus relaciones florísticas con determinadas zonas litorales murciano-almerienses (Tabarca, Cabo Roig, etc.).

Paronychia cymosa (L.) DC. in Lam.

VALENCIA: Puçol —«El Picaio», Serra Calderona— (L'Horta Nord). Un pliego de *Calduch* (VF-3530), en el que ya se indica «muy rara». No conocemos otras citas para la Comunidad Valenciana de este terófito acidófilo.

Pinguicula longifolia Ramond ex DC.

CASTELLÓN: Penyagolosa —Cova dels Angels— (L'Alcalatén). Un pliego de *Calduch* (VF-6850) en el que aparece como *Pinguicula grandiflora* Lamk. var. *longifolia* DC. Matiza las tobas rezumantes (*Adiantetea* Br.-Bl. 1947) más frescas del territorio septentrional valenciano. No conocemos otras citas para la Comunidad Valenciana.

Ribes alpinum L.

CASTELLÓN: Portell de Morella y Puerto de las Cabrillas (Els Ports de Morella). En comunidades del *Pruno-Rubion ulmifolii* O. Bolós 1954. Para la Comunidad Valenciana solo conocemos la cita de J. VIGO (*Inst. Est. Catal. (Ciencias)*, 37: 70, 1968) para Penyagolosa (L'Alcalatén). VF-12374 y VF-12375.

Tagetes minuta L.

CASTELLÓN: Benicassim —El Desert de les Palmes— (La Plana Alta). Un pliego de *Calduch* (VF-3922) con el comentario «Abundantíssima vora camí i dins les vinyes». No conocemos ninguna cita de este neófito para la Península Ibérica, y aunque Flora Europaea lo considera naturalizado en el Sur de Europa, no recoge las siglas Hs.

(Aceptado para su publicación el 15-IX-1985)