

**LINARIA OBLONGIFOLIA (BOISS.) BOISS. & REUTER SUBSP.
OBLONGIFOLIA EN EXTREMADURA**

M. LADERO ALVAREZ*

Key words: Chorology, *Linaria oblongifolia* subsp. *oblongifolia*, Cáceres, Spain.

Son varias las citas dadas para Extremadura de *Linaria oblongifolia* subsp. *haenseleri* (Boiss. & Reuter) Valdés, hasta el punto de haberla herborizado en la mayor parte de las intercalaciones básicas, formando parte del pastizal terofítico perteneciente a la alianza *Thero-Brachypodion distachyae* (Br.-Bl., 1925) Rivas-Martínez, 1978.

El taxon que aquí comentamos se desarrolla en cornisas y rellanos sobre lito-suelos procedentes de pizarras cámbricas, en las proximidades del puente romano de Alcántara. Estos biótopos tienen, por su orientación, un cierto carácter esció-filo no exento de una nitrofilia manifiesta; por tal motivo, se encuentra integrada en la comunidad *Galio-Anthriscetum caucalidis* Rivas-Martínez, 1978 subas. *geranietosum lucidi* Ladero & al., 1983.

Representa la cita más septentrional de este taxon; B. VALDES (*Revisión de las especies europeas de Linaria con semillas aladas*, pág. 124. 1970) la considera calcícola y propia de las sierras malacitanas. La presencia en Extremadura, sobre suelos silíceos, está más ligada a la termicidad que al sustrato; la localidad de recolección no supera los 250 m.s.n.m. y la vegetación climax corresponde a los acebuchales de *Asparago-Rhamnetum oleoidis* Rivas Goday, 1959.

CC: Alcántara, 29S PD89. 3-III-1985, Ladero, Santos & González. SALAF: 10.286.

Agradezco a B. VALDÉS la ayuda prestada en la confirmación del taxon.

(Aceptado para su publicación el 10-I-1986)

* Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Salamanca.