

NUEVA LOCALIDAD PARA *ERODIUM MOURETII* PITARD

J.L. PÉREZ CHISCANO *

Key words: Chorology, Phytosociology, *Erodium mouretii* Pitard, Huelva (Spain).

Este esquizoendemismo que de forma discontinua se presenta en las cuarcitas del N de Marruecos y en el W y SW de la Península Ibérica, aparece ahora en fisuras y cornisas de cuarcitas ordovicenses de La Virgen de la Peña (400 m.s.n.m.), 4 km. al sureste de Puebla de Guzmán (Huelva) —SALAF: 10.265; legit *J.L. Pérez Chiscano*. 16-VI-1985—. Desde el punto de vista corológico, este territorio se integra en el sector Mariánico-Monchiquense de la provincia Luso-Extremadurese.

Convive con *Digitalis purpurea* L. var. *tomentosa* (Hoffmanns. & Link) Brot. *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy, *Sedum hirsutum* All. y *Dianthus lusitanus* Brot., formando parte de una comunidad referible a *Rumici-Dianthetum lusitani* (Rivas Goday, 1964) Rivas-Mart., Izco & Costa, 1973.

Las primeras citas ibéricas y europeas lo fueron para las sierras centrales de la provincia de Badajoz (cf. LADERO, PÉREZ CHISCANO & VALDÉS BERMEJO, *Anales Inst. Bot. Cavanilles*, 35: 145-153. 1978) observando allí el mismo comportamiento ecológico y fitosociológico al indicado en la presente comunicación.

(Aceptado para su publicación el 25-VI-1985)

* Villanueva de la Serena (Badajoz)