

DE PLANTIS LEGIONENSIBUS. NOTULA XIII

E. PUENTE GARCIA *

RESUMEN: En el presente trabajo se aportan datos ecológicos y fitosociológicos sobre algunos táxones que se citan por primera vez para la flora leonesa, tales como: *Capsella x gracilis*, *Lathyrus filiformis*, *Campanula latifolia*, *Anthemis triumphetti* y *Centaurea x zubiae* nm. *somedana*. De otras especies, poco conocidas en la provincia, se indican nuevas localidades que permiten ir precisando su área provincial.

SUMMARY: In this paper, some ecologic and phytosociological facts about some taxa recorded for the first time within the flora of León province. They are: *Capsella x gracilis*, *Lathyrus filiformis*, *Campanula latifolia*, *Anthemis triumphetti* y *Centaurea x zubiae* nm. *somedana*. New localities of other few known species are given in order to precise its provincial area.

KEY WORDS: Chorology, phytosociology, vascular flora, León (Spain)

Como continuación de la serie iniciada en el Departamento de Botánica de la Facultad de Biología de León y con el fin de llegar a un mejor conocimiento de la flora leonesa, en esta nota se presentan varios táxones interesantes, resultado de diversas campañas botánicas realizadas por el NW de la provincia.

Para cada taxon se indican las coordenadas UTM, en cuadrículas de 10 Km. de lado, de las localidades en que se recolectó, así como el número de pliego del Herbario del Departamento de Botánica de la Facultad de Biología de León (LEB) en que están depositados.

* Dpto. Biología Vegetal (Botánica), Facultad de Biología. León.

Aconitum vulparia Reichb. ex Spreng. subsp. **neapolitanum** (Ten.) Muñoz Garmendia in J. Molero & C. Blanché, *Anales Jard. Bot. Madrid* 41 (1): 212 (1984)

LEON: Embalse de Las Rozas (29TQH15) 5-VIII-1982. LEB 13897. En bosque mesofítico (*Carpinion* (Issler 1931) Oberdorfer 1953).

Taxon señalado por MOLERO & BLANCHE (*Anales Jard. Bot. Madrid* 41 (1): 212. 1984) para la mitad septentrional de España y Sierra Nevada, que ha sido citado por NIETO FELINER (*Ruizia* 2: 41. 1985) de Los Apóstoles (Montes Aquilianos) (29TPH9702).

Aconitum vulparia Reichb. ex Spreng. subsp. **ranunculifolium** (Reichenb.) Laínz, *Aport. Fl. Gallega* 7: 3 (1968).

LE: La Cueta (29TQH26) 20-VIII-1982. LEB 14229 y entre Quejo y Cacabillo (29TQH26) 28-VII-1984. LEB 24416. En lugares húmedos sobre calizas.

MOLERO & BLANCHE (*Anales Jard. Bot. Madrid* 41 (1): 212. 1984) indican, para este taxon, una distribución por el Pirineo Oriental, Montes Cántabros, Sistema Central y montañas boreo-occidentales. ROTHMALER (*Vegetatio* 8: 601. 1954) citaba de Los Apóstoles *A. ranunculifolium* Reichenb.

Capsella x gracilis (Gren) Maire, *Fl. Af. Nord.* 13: 182 (1967)
(*C. rubella* Reuter x *C. bursa-pastoris* (L.) Medicus; *C. gracilis* Gren)

LE: Sosas de Laciana (29TQH25) 17-VIII-1983. LEB 18428. En borde de camino (*Sisymbrio officinalis-Hordeetum murini* Br.-Bl. 1967).

Este híbrido se caracteriza por presentar racimo fructífero muy largo; silículas estériles, triangulares, pequeñas, de 1,5-2 x 1,5-1,8 mm.; estilos de menos de 0,3 mm. superando la escotadura y los pétalos blancos, doble de largo que los sépalos, éstos con tintes violáceos (Fig. 2).

Umbilicus heylandianus Webb & Berth., *Phyt. Canar.* 1: 176 (1840)

LE: Tejedo del Sil (29TQH15) 2-VII-1983. LEB 16805; Villarino del Sil (29TQH15) 24-VII-1983. LEB 17794 y La Martina (Ponferrada) (29TPH91) 26-VI-1983. Leg.: M^a J. López Pacheco & E. Puente. LEB 20747. En setos y herbazales de linderos de bosques, sobre sustratos rocosos.

Geófito canario e ibero-mauritánico que se conoce, en nuestra provincia, de Riaño (30TUN36) (LAINZ & cols., *Bol. Inst. Est. Ast.*, Ser. C. 5: 18. 1962) y Pedredo (29TQH30) (LLAMAS GARCIA, *Flora y vegetación de la Maragatería (León)*: 71. 1984) (Fig. 1).

Lathyrus filiformis (Lam.) Gay, *Ann. Sci. Nat.* ser. 4 (Bot.), 8: 315 (1857)

LE: Entre Quejo y Cacabillo (29TQH26) 28-VII-1984. LEB 24406. En pastizales sobre suelos pedregosos calizos.

FERNANDEZ PRIETO (*Estudio de la flora y vegetación del Concejo de Somiedo*: 116. 1981) lo señaló, para Asturias, de Peña Blanca (29TQH26) y de los alrededores del Lago del Valle (29TQH36).

Sideritis hyssopifolia L. subsp. **hyssopifolia** var. **laxispica** López Pacheco, *Anales Jard. Bot. Madrid* 42 (1): 251 (1985)

LE: Entre Quejo y Cacabillo (29TQH26) 28-VII-1984. LEB 24358; Quejo (29TQH26) 19-VIII-1983. LEB 24361 y La Cueta (29TQH26) 4-IX-1983. LEB 24362. En pastizales sobre sustrato calizo (*Festuco-Brometea*).

Segunda mención provincial de esta variedad descrita por LOPEZ PACHECO (*l.c.*) de Valdeteja (30TUN05) (Fig. 3).

Campanula latifolia L., *Sp. Pl.* 165 (1753)

LE: Peña Derecha (Villarino del Sil) (29TQH15) 24-VII-1983. LEB 17784. En fresnedas (*Carpinion* (Issler 1931) Oberdorfer 1953).

A este taxon ha de referirse lo que LOPEZ PACHECO & *al.* (*Anales Jard. Bot. Madrid* 40 (1): 147. 1983) mencionaron como *C. trachelium* L. del Embalse de Las Rozas (29TQH15). PEREZ GARCIA (*Flora y vegetación de la comarca de Omaña*: 215. 1984) la señaló del Puerto de La Magdalena (Rioscuro) (29TQH25).

Anthemis triumfetti (L.) DC. in Lam. & DC., *Fl. Fr.* ed. 3, 5: 483 (1815)

LE: Puente de Las Palomas (29TQH25) 9-VII-1983. LEB 19121. En calizas.

Los materiales de dicha localidad corresponden a la forma *aligulata* (Losa) Talavera, *Herbarium Universitatis Hispalensis. Flora Selecta*. Centuria I: 30 (1982) (*Cota aligulatae* Losa) (LOSA, *Contribución al estudio de la flora y vegetación de la provincia de Zamora*: 127. 1949).

Se conoce en nuestra provincia de Villanueva de Omaña (29TQH34) (PEREZ GARCIA, *l.c.*: 222. 1984) y de Aralla (30TTN75) (PEREZ MORALES, *Flora y vegetación de la cuenca alta del río Bernesga (León)*: 127. 1984).

Centaurea x zubiae Pau nothomorpha **somedana** Fdez. Casas & Susanna, *Treballs de l'Institut Botanic de Barcelona* 10: 115-116 (1986)

LE: Subida al Puerto de Somiedo (29TQH26) 6-VII-1982. LEB 20133.

Notomorfa procedente del retrocruzamiento de *C. x zubiae* (*C. lagascana* Gracils x *C. ornata* Willd.) con *C. lagascana*. Convivía con el doble parental *C. lagascana* y se caracteriza por presentar fimbrias en la base de la espina terminal de los apéndices de las brácteas del involucre.

Scorzonera crispatula (Boiss.) Boiss., *Voy. Bot. Midi Esp.* 2: 741 (1845)

LE: Piedrafita de Babia (29TQH25) 23-VI-1984. LEB 24040 y 24086 y entre Piedrafita y Carrasconte (29TQH25) 23-VI-1984. LEB 24173.

Se conoce de Viadangos (30TTN75) y Santa Lucía de Gordón (30TTN85) (PEREZ MORALES & *al.*, *Studia Botanica*, 2: 189. 1983) y Rodillazo (30TTN95) 21-VI-1984. Leg.: F. Gómez, LEB 26913 (Fig. 4).

Streptopus amplexifolius (L.) DC. *in* Lam. & DC., *Fl. Fr.* ed. 3, 3: 174 (1805)

LE: Valle de Fontaninas (Tejedo del Sil) (29TQH15) 29-VII-1984. LEB 24387. En bosque mesofítico (*Carpinion* (Issler 1931) Oberdorfer 1953).

Únicamente se conoce, en nuestra provincia, de La Baña (29TPG88) (LLAMAS & al., *Lazaroa* 6: 284. 1985) (Fig. 5).

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley subsp. **villarvildensis** (T. E. Díaz & F. Prieto) Rivas-Martínez, T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas, *Veg. Picos Europa*: 276 (1984)

LE: Puerto de Cerredo (29TQH05) 22-V-1983. LEB 15624 y Puerto de La Magdalena (29TQH25) 22-V-1983. Leg.: T. E. Díaz & al. LEB 15626. En piornales (*Genistenion polygaliphyllae* Rivas-Martínez, T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984).

Se conoce, en nuestra provincia, de la Collada de Aralla (30TTN75) (LOPEZ PACHECO & al., *Anales Jard. Bot. Madrid* 40 (1): 148. 1983) (Fig. 6).




Figura 1. Distribución en la provincia de León de *Umbilicus heylandianus* Webb & Berth. * Nuevas localidades.




Figura 2. *Capsella x gracilis* (Gren) Maire (LEB 18428). A: Aspecto general. B: Flor. C: Silícula.




Figura 3. Distribución en la provincia de León de *Sideritis hyssopifolia* subsp. *hyssopifolia* var. *laxispica* López Pacheco * Nuevas localidades.




Figura 4. Distribución en la provincia de León de *Scorzonera crispatula* (Boiss.) Boiss. * Nuevas localidades.




Figura 5. Distribución en la provincia de León de *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. * Nuevas localidades.




Figura 6. Distribución en la provincia de León de *Narcissus asturiensis* subsp. *villarvildensis* (T. E. Díaz & F. Prieto) Rivas-Martínez & al. * Nuevas localidades.

(Aceptado para su publicación el 10-I-1988)