

ALGUNAS ESPECIES INTERESANTES DE LA SIERRA DE LA SAGRA (GRANADA)

A.M. NEGRILLO *

G. MARÍN CALDERÓN *

Key words: Chorology, vascular flora, Sierra de la Sagra (Granada, Spain).

RESUMEN.— Se comentan siete taxones recolectados en Sierra de la Sagra (Granada) con interés corológico.

SUMMARY.— Commentary is made of seven taxa collected from Sierra Sagra (Granada), with a chorological interest.

Salix fragilis L.

Sierra de la Sagra, Cortijo de la Retamosa, 30S WH3603, 1460 m, bordes de cursos de agua. 8-X—1978. *Negrillo* (GDA 12121).

A pesar de tratarse de un taxon ampliamente distribuido por toda España, no hay referencias exactas de esta especie para la provincia de Granada. Los escasos ejemplares que aparecen en la zona objeto de estudio, se encuentran naturalizados junto a *S. purpurea* L. formando parte de las comunidades ribereñas de *Salicetea purpureae* Moor 1958.

Arceuthobium oxycedri (DC.) Biel.

Sierra de la Sagra, Cortijo Casa de la Virgen 30S WH4103, 1400 m, parasitando a *Juniperus oxycedrus* L., 3-V-1979, *Negrillo* (GDA 11977).

Aunque es una especie abundante en el Sur de España, no existen excesivas citas; de Granada en concreto existe la de MORALES & col. (*Trab. Dep. Bot. Univ. Granada* 5: 5. 1978), y de Andalucía en conjunto existe una cita en la obra de M. WILLKOMM & J. LANGE (*Prodromus Fl. Hisp* 1: 24. 1861) atribuida a WEBB (*Iter Hisp.*: 42. 1838) y otra de ASENSI & NIETO (*Inst. Est. Almerienses. Homenaje al botánico R. Sagredo*: 45. 1982).

* Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.

Pimpinella tragium Vill. subsp. **lithophila** (Schischkin) Tutin

Sierra de la Sagra, Cortijo el Ferrario 30S WH3900, 1900 m, 2-VII-1983.

Negrillo, Marín & Hurtado (GDA 15604). Se encuentra buscando la protección de las densas almohadillas de *Erinacea anthyllis* Link.

Sólo citada anteriormente en Sierra Nevada y Tejada (Granada), además de numerosas localidades norteñas.

Atropa baetica Willk.

Sierra de la Sagra, Cortijo de la Capellanía 30S WG3698, 1600 m. Claros de un pinar. 1-VII-1983. *Negrillo, Marín & Hurtado* (GDA 15441).

Taxon que aparece puntualmente formando manchas en los claros del bosque de la ladera suroeste de la Sierra.

Hyosciamus niger L.

Sierra de la Sagra. Cortijos de la Umbria, 30S WG3599. En terrenos baldíos y nitrificados. 12-V-1977. *Negrillo* (GDA 12113). Cortijo de la Capellanía 30S WG3698. 1600 m. 1-VII-1983. *Negrillo, Marín & Hurtado* (GDA 15602).

Lactuca perennis L. subsp. **granatensis** Charpin & Fernández Casas

Sierra de la Sagra, Collado de las Víboras. 30S WH3901. 21-VII-1976. *Negrillo* (GDA 11885). Ferrario 30S WH3900. 2100 m. 14-VII-1977. *Negrillo* (GDA 11884) y 30S WH3900. 1900-2100 m. en *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. & al. 1947. 2-VII-1983. *Negrillo, Marín & Hurtado* (GDA 15603).

Citada por BORJA (*Anales Inst. Bot. A.J. Cavanilles* 13: 455-468) para la Sagra como *L. perennis* s.a. Posteriormente FERNÁNDEZ CASAS & CHARPIN (*Candollea* 36: 237. 1981) recogen este taxon en la cercana Sierra de Baza y lo asimilan a la subespecie *granatensis* Charpin & Fernández Casas.

El taxon, ampliamente herborizado por nosotros en los pedregales calizos de la ladera sureste de la Sagra, es incluíble en la subespecie citada.

Sorbus aucuparia L. subsp. **aucuparia**

Sierra de la Sagra, Cortijo de la Capellanía. 30S WG3899, 2100 m. 1-VII-1983. *Negrillo, Marín & Hurtado* (GDA 15605).

Taxon relativamente frecuente en el Centro, Este y Norte de la Península y escaso en el Sur.

(Aceptado para su publicación el 30-XI-1984).