

DE PLANTIS LEGIONENSIBUS. NOTULA XV

Additions to Leon flora checklist. Notula XV

Félix LLAMAS y Carmen ACEDO

Dpto. Biología Vegetal, Universidad de León. Campus de Vegazana, s/n. 24071 León, España.

BIBLID [0211 - 9714 (1997) 16, 139-141]

Fecha de aceptación del artículo: 17-9-97

Como continuación de la serie que publica el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de León, en este artículo se citan por primera vez 14 especies para el catálogo florístico de la provincia de León (NO de España), así como otra que sin ser novedad absoluta, representa una aportación interesante. Cuando no se señale nada diferente, debe entenderse que según la bibliografía consultada, son nuevas citas para la flora leonesa.

Se aportan datos ecológicos del medio en que fueron recolectadas.

Abutilon teophrasti Medik., *Malvenfam.* 28 (1897)

León: Santa María del Páramo, 30TTM79, borde de un cultivo, *F. Llamas & C. Acedo*, 20.X.1995, LEB 53649.

Neófito, originario del sur de Asia, que se está expandiendo con relativa rapidez.

Celtis australis L., *Sp. Pl.* 1043 (1753)

Le: Salas de la Ribera, 29TPH70, viviendo entre encinas a 390 m, *F. Llamas & C. Acedo*, 20.IV.1989, LEB 46651. También la hemos visto, aunque no tenemos ningún pliego, en el interior del Castillo de los Templarios de Ponferrada. Posiblemente asilvestrada.

Todos los individuos vistos son jóvenes.

Coronilla valentina L. subsp. **glauca** (L.) Batt. in Batt. & Trabut, *Fl. Algér.* (Dicot.) 285 (1889)

Le: La Candamia, 30TTN92, borde de cultivo de *Pinus* sobre margas calcáreas, 25.IV.1993, C. Acedo, LEB 53245.

Es una planta de distribución mediterránea, aparentemente autóctona en el territorio, aunque escasa y rara.

Solanum luteum Miller, *Gard. Dict.* ed. 8, nº 3 (1768)

Le: La Bañeza, 30TTM58, cultivos de secano, 20.IX.1994, C. Acedo, LEB 42998.

Planta autóctona y poco frecuente, que posiblemente se haya confundido con *Solanum nigrum*.

Plantago atrata Hoppe subsp. **discolor** (Gand.) Laínz, *Bol. Soc. Brot.*, 53: 43 (1979)

Le: Valdorra, 30TUN05, pastizal de *Bromion*, en terreno calcáreo, 5.VII.1979, F. Llamas & C. Acedo, LEB 42995.

Cuando LAÍNZ (*loc. cit.*) hace la combinación, señala que es abundante en las montañas calcáreas de la Cordillera Cantábrica e indica su presencia en Cantabria y Palencia.

Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp., *Lista Esp. Herb. Port.* 28 (1913)

Le: Foncebadón, 29TQH10, fondo de valle, en las proximidades de regato, en comunidades de *Molinietalia*, 2.VII.1995, F. Llamas & C. Acedo, LEB 53650. *idem* 17.VII.1992, F. Llamas & C. Acedo, LEB 42993.

Fritillaria legionensis F. Llamas & J. Andrés, *Lagascalía* 11(1): 68 (1983)

Le: Teleno, 29TQG19, Pastizal de *Teesdaliopsio-Festucetum summilusitanae*, 9.VII.1992, F. Llamas & C. Acedo, LEB 53059.

Esta cita amplía notablemente el área conocida de la especie, citada por LLAMAS & ANDRÉS (*Lagascalía* 11(1): 67-70, 1983) y LÓPEZ PACHECO (*Flora y vegetación de las cuencas alta y media del río Curueño*, 1-384. 1988), restringida al norte de la provincia de León. También es diferente el nicho ecológico en que ha sido recolectada.

Dipcadi serotinum (L.) Medicus, *Acta Acad. Theod.-Palat.* 6: 431 (1790)

Le: Pinilla de la Valdería, 29TQG47, brezal bajo pinar de repoblación, 9.VII.1992, F. Llamas & C. Acedo, LEB 50960.

Muy escasa.

Festuca graniticola Kerguélen & Morla, *An. Jard. Bot. Madrid* 42(1): 156 (1985)

Le: Morales del Arcediano, 29TQH30, aulagar del *Lavandulo-Genistetum hystrix*, 20.VII.1978, *F. Llamas*, LEB 42999. Santiago Millas, 29TQG39, aulagar con *Genista hystrix* y *Echinospartum barnadesii*, 14.VI.1978, *F. Llamas*, LEB 43000. Proximidades de Corporales, 29TQG08, aulagar con *Genista hystrix* y *Echinospartum barnadesii*, 9.VII.1992, *F. Llamas & C. Acedo*, LEB 43001.

Planta descrita de la provincia de Orense, parece ser una fiel acompañante de *Echinospartum barnadesii*.

Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger, *Bot. Jahrb.* 74: 567 (1949)

Le: Redipollos, 30TUN16, 3.VII.1983, *F. Llamas*, LEB 53247.

Parece ser la cita más septentrional de esta especie en la Península Ibérica.

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv., *Agrost.* 101, 155 (1812)

Le: Los Barrios de Luna, 30TTN64, 30.IX.1994, ladera sobre sustrato calcáreo, en comunidades de *Bromion*, *F. Llamas*, LEB 42996.

Ventenata dubia (Leers) Cosson in Durieu, *Expl. Sci. Algérie* 2: 104 (1855)

Le: Cármenes, 30TTN96, terreno pedregoso en exposición S, 14.VI.1991, *F. Llamas & C. Acedo*, LEB 50962.

Holcus mollis L. subsp. **reuteri** (Boiss.) Tutin, *Bot. Jour. Linn. Soc.* 76: 363 (1978)

Le: Villaverde de Abajo, 30TTN92, en comunidades ruderales, borde de reguero, 20.VII.1990, *F. Llamas & C. Acedo*, LEB 42997.

Es una planta relativamente frecuente, aunque no existen recolecciones en la provincia de León.

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv., *Agrost.* 71, 162 (1812)

Le: Santa Cruz del Sil, 29TQH03, cultivo de huerta, 5.IX.1979, *F. Llamas*, LEB 53248.

Sporolobus indicus (L.) R. Br., *Prodr. Fl. Nov. Holl.* 170 (1810)

Le: Cabañas Raras, 29TPH92, regato húmedo, 14.XI.1988, *F. Llamas*, LEB 46614.
Neófito de origen tropical, presente de momento sólo en el Bierzo.