

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE *MONOTROPA HYPOPITYS*  
L. EN PORTUGAL  
*On the distribution of Monotropa hypopitys L. in Portugal*

Paulo CARDOSO DA SILVEIRA & João DOMINGUES DE ALMEIDA  
*Departamento de Botânica da Universidade de Coimbra. Arcos do Jardim,  
P-3049 Coimbra, Portugal*

BIBLID [0211 - 9714 (2001) 20, 167-168]

Fecha de aceptación de la nota: 18-09-2001

**Monotropa hypopitys** L., *Sp. Pl.*: 387 (1753)

PORTUGAL: **BL**: «Góis, pr. Liboreiro», 29TNE7846, alt. 610 m, exp. ±N, «num pinhal, em solo arenoso», 2-VII-2000, *P. Silveira & J. D. Almeida* 2766, COI.

Durante las diversas campañas botánicas realizadas por la «Serra do Açor», herborizamos en un pinar (BL) algunos ejemplares de esta rara especie en vías de extinción, propia de matorrales sombríos y húmedos (FRANCO, *Nova Flora de Portugal*, 2: 2. 1984). En la BL había sido recolectada en «Buçaco», «Dunas do Pinhal do Urso» y en «Albergaria-a-Velha».

Además de las cuatro provincias señaladas por Montserrat MARTÍ (in *Flora ibérica*, 4: 539. 1993), esta planta saprófita también ha sido recolectada en DL y Mi.

Por todo lo anteriormente señalado y las informaciones indicadas por COUTINHO (*Flora de Portugal*, ed. 2: 547. 1939): «Matas sombrias, junto às raízes das árvores: Pinhal do Urso, Buçaco e Fundação»; SAMPAIO (*Flora Portuguesa*: 450. 1947): «Parasita nas raízes de árvores, desde o Douro à Beira (rara)»; FRANCO (*l.c.*): «CW. aren. e CN. mont.» e M. MARTÍ (*l.c.*): «(BA) (BB) BL (TM)», pensamos que la distribución más correcta de esta especie en Portugal debe ser: rara en matorrales caducifolios, pinares y eucaliptales, en las provincias del Norte y Centro: BA, BB, BL, DL, Mi, TM (0-1.100 m).



FIGURA 1: Distribución en Portugal de *Monotropa hypopitys* L.  
□ herborizaciones realizadas en el siglo XIX; ■ herborizaciones realizadas en el siglo XX; ● nueva localidad.

#### MATERIAL

**PORTUGAL: BA:** «Entre Mosteiro de Fragoas e S. Miguel», 29TNE89, 26-V-1940, *R. Palbinba & Luíz G. Sobrinho*, LISU P28213. **BB:** «Matta do Fundão», 29TPE24, 7-VI-1900, *C. Zimmermann* 265, COI; «Fundão: Alcaide», 29TPE34, «Nos soutos», 5-VI-1930, *Carrisso & Mendonça* 1710, COI. **BL:** «Buçaco», 29SNE56, VI-1877, Bernardino, COI; «Dunas do Pinhal do Urso», 29SNE02, 18-V-1931, *A. Gonçalves da Cunba & L. Gonçalves Sobrinho*, LISU P28214; «Albergaria-a-Velha», 29SNF4305, «num eucaliptal, abundante», 9-VII-1975, *A. Serra, F. Mota & Bernardino*, PO 21249 (ALMEIDA DA SILVA & CARVALHO in *Bol. Soc. Brot.*, sér. 2, 62: 192. 1989). **DL:** «Vila Nova de Gaia: S. Cristóvão de Mafamude», 29TNF35, 18-V-1880, *Manuel Albuquerque*, PO: GS 6555; *Ídem*, 18-V-1880, *Isaac Newton*, PO: GS 6556. **Mi:** «Esposende: Ofir», 29TNF19, «num pinhal», 9-V-1995, *Jesus Izco & José Carlos Costa*, LISI. **TM:** «entre Bragança e Macedo de Cavaleiros, na Serra da Nogueira, Cruzes x Mosqueiro», 29TPG71, «Numa mata de *Quercus pyrenaica*», alt. 1.100 m, 22-VI-1988, *M. Graça Leitão Serra, Fátima Costa & Amadeu José* 127, LISU 152756.

#### AGRADECIMIENTOS

A los responsables de los herbarios consultados (AVE, BRESA, COI, ELVE, HVR, LISE, LISI, LISU, PO).