

*HEDYSARUM BOVEANUM* SUBSP. *PALENTINUM* VALDÉS  
EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID  
*Hedysarum boveanum* subsp. *palentinum* Valdés in  
*Valladolid province (Spain)*

María SANTOS VICENTE<sup>1</sup> & Patricio BARIEGO HERNÁNDEZ<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. E-37007 Salamanca, España. mariasantos\_bot@yahoo.es;* <sup>2</sup> *Camino la Lobata, s/n, E-49025, Zamora, España. bariego@teleline.es*

BIBLID [0211-9714 (2003) 22, 55-56]

Fecha de aceptación de la nota: 19-12-03

***Hedysarum boveanum*** subsp. ***palentinum*** Valdés in *Lagascalía*, 21: 253 (2000)

**Valladolid:** Tudela de Duero, Cuesta de La Parrilla, 30TUM6903, 800 m, quejigar en ladera sobre margas yesíferas, 03-VI-2003, *P. Bariego & M. Santos Vicente*, SALA 108368.

Durante la primavera de 2003 se colectaron en Tudela de Duero (Valladolid) unos ejemplares del género *Hedysarum* (*Leguminosae*) que fueron determinados como *Hedysarum boveanum* subsp. *palentinum* Valdés según la reciente revisión del género para la Península Ibérica [VALDÉS, *Flora iberica*, 7 (2): 943-955. 2000].

Se diferencia de *H. boveanum* subsp. *europaeum* Guitt. & Kerguélen, presente en el C, S y mitad E peninsular, por presentar hojas con 4-11 pares de foliolos, inflorescencia en racimo denso con 5-13 flores y fruto inerme con 1-3 segmentos [VALDÉS, *Lagascalía*, 21 (1): 249-254. 1999].

En la misma localidad convive con otros endemismos de aptencias gipsófilas como *Moricandia moricandioides* (Boiss.) Heywood subsp. *moricandioides*, *Ononis tridentata* L. subsp. *tridentata* o *Thymelaea pubescens* (L.) Meisn. subsp. *pubescens*.

Considerado hasta el momento endémico de los Valles del Cerrato palentinos –VALDÉS, *l. c.*, 2000: 949–; la cuadrícula UTM indicada es errónea puesto que esa zona corresponde a la cuadrícula 30TVM0236 y no a la 30TVM3602, la cita que aportamos supone una destacable ampliación de su areal ya que esta nueva población se encuentra aproximadamente a 50 km en dirección SW de la localidad clásica de Cevico Navero (Palencia). Dado que no existe ninguna discontinuidad geográfica notable entre los territorios palentinos del Cerrato y los vallisoletanos de la ribera del Duero donde la citamos ahora, es bastante probable su presencia en otras localidades intermedias de los páramos y cuevas del valle del Esgueva, aunque no fue hallada durante la elaboración de un catálogo tan exhaustivo como el de FERNÁNDEZ ALONSO [*Flórula del término municipal de Encinas de Esgueva y zonas limítrofes*. Tesis de Licenciatura, Universidad de Salamanca: 95. 1985. *inéd.*].

Atendiendo a su reducida área de distribución general y a las escasas poblaciones que se conocen, se ha propuesto su inclusión en el listado de *Flora de Castilla y León de Interés Especial*, en proceso de elaboración como informan RICO, AMICH & SALDAÑA [*Conservación Vegetal*, 7: 10-11. 2002].

#### AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer al profesor Enrique Rico (Universidad de Salamanca) sus siempre interesantes precisiones.